



Catálogo de
PRODUTOS



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistrifarma.com.br



Catálogo de Produtos



Genéricos

MIP
(OTC)

Farma



LABORATÓRIO
Green
Pharma

A cim a de tudo, saúde.



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE

www.grupodistrifarma.com.br





A Greenpharma, indústria farmacêutica fundada em 1989, iniciou suas atividades no mercado de medicamentos em 1993. Seu desempenho foi marcado pelo crescimento tanto da linha de produção quanto na expansão da linha de produtos no mercado farmacêutico brasileiro. Desde o início de suas atividades, o laboratório foca suas ações em princípios que vão muito além de produzir medicamentos: a confiança do consumidor.

Confiança reconhecida ao ser a 1ª Indústria Farmacêutica do Centro Oeste e 21º centro credenciado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a fazer parte da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS) qualificando a realizar Testes de Equivalência Farmacêutica para registro de medicamentos Genéricos e Similares.

Com toda esta confiança, a Greenpharma investe cada vez mais na qualificação de seus profissionais, buscando através do conhecimento e de inovações tecnológicas o desenvolvimento de novos medicamentos, atendendo sempre aos procedimentos que regem as normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF).

Os cuidados com a qualidade dos produtos começam antes mesmo da fabricação, através da qualificação dos fornecedores! A Garantia da Qualidade, analisa periodicamente os produtos produzidos garantindo a uniformidade, estabilidade e eficácia dos medicamentos em conformidade com os padrões de qualidade.

O rígido controle ambiental através de sistemas de ar filtrado e climatizado e o mais moderno tratamento de água em toda planta industrial, somado às modernas instalações e equipamentos automatizados proporciona segurança e controle do processo produtivo.

A Greenpharma conta com uma força de vendas que possui profissionais treinados e qualificados, fazendo com que os seus medicamentos estejam em todo território brasileiro, por meio de uma logística desenvolvida através de uma rede de distribuidores que garante a qualidade de nossa marca.

A confiança e segurança no que fazemos, através da ética e do respeito à saúde, fazem com que os medicamentos Greenpharma tenham o grande diferencial da marca de quem assina.



Ética e respeito à saúde,
esta é a nossa marca.



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistrifarma.com.br





dipirona sódica



Registro M.S.

1.2019.0125

Indicações

Analgésico e antitérmico.

Apresentação

Comprimido: 500mg
caixa com 100

Referência

Novalgina
Sanofi Aventis.



mebendazol



Registro M.S.

1.2019.0014

Indicações

Antihelmíntico polivalente (*Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichives*, *Enterobius vermiculores*, *Ancylostors duodenale*, *Necator arcricanos*, *Taemia solium*, *Taemia sagimata*).

Apresentação

Suspensão oral:
100mg/5mL
suspensão oral
cx c/ 1 frs 30mL e
copo medida

Referência

Pantelmin
Janssen-Cilag.

Fonte: Bula do Produto

Este informativo destina-se exclusivamente aos profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Outubro/2014



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistrifarma.com.br





nistatina



Registro M.S.

1.2019.0122

Indicações

Candidíase vaginal.

Contra Indicações

Pacientes sensíveis a qualquer componente da fórmula.

Apresentação

Creme vaginal:
100.000 UI/4g
creme vaginal
cx com 1 bisnaga
de 60g c/ aplicadores

Referência

Micostatin
Bristol-Myers
Squibb.



paracetamol



Registro M.S.

1.2019.0106

Indicações

Analgésico e antitérmico.

Apresentação

Solução oral gotas:
200mg/mL
caixa com 1 frasco
de 15mL

Referência

Tylenol
Janssen-Cilag.

Fonte: Bula do Produto

Este informativo destina-se exclusivamente aos profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Outubro/2014



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistrifarma.com.br



sulfato de terbutalina



Registro M.S.

1.2019.0142

Indicações

Tratamento asma brônquica, bronquite crônica e enfisema.

Contra Indicações

Pacientes sensíveis a qualquer componente da fórmula.

Apresentação

6 ampola de 1mL

Referência

Terbutil União Química



Fonte: Bula do Produto

Este informativo destina-se exclusivamente aos profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Outubro/2014



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistribarma.com.br





Bacidermina

sulfato de neomicina +
bacitracina zíncica



Registro M.S.

1.2019.0067

Indicações

Antibiótico tópico para infecções bacterianas da pele.

Apresentação

Pomada: 5mg/g sulfato neomicina, 250UI/g bacitracina zíncico bisnaga com 10g

Referência

Nebacetin
Takeda.



Colipan

butilbrometo de escopolamina



Registro M.S.

1.2019.0029

Indicações

Indicado para cólicas gastrointestinal e genitourinário e discenias da vias biliares.

Contra Indicações

A pacientes sensíveis a qualquer componente da fórmula e para idosos.

Apresentação

10mg
caixa com 30 comprimidos

Referência

Buscopan
Boehringer
Ingelheim

Fonte: Bula do Produto

Este informativo destina-se exclusivamente aos profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Outubro/2014



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistrifarma.com.br





Dorgex

salicilato de metila + associações



Registro M.S.

1.2019.0077

Indicações

Coadjuvante no tratamento das dores reumáticas, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares.

Apresentação

Pomada: bisnaga com 20 g

Referência

Gelol
Cosmed



Fonte: Bula do Produto

Este informativo destina-se exclusivamente aos profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Outubro/2014



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistrifarma.com.br





Benzol

albendazol



Registro M.S.

1.2019.0008

Indicações

Antihelmíntico e Antiparasitário
Ascaris lumbricoídes,
Entereobius veoricularis,
Necator shericanus,
Ancylostomo duodenale,
Trichuris trichiura,
Strongyloides stercoralis,
Taemiaspp e *Hymenolepsis*

Contra Indicações

Pacientes sensíveis a qualquer componente da fórmula e a mulheres que desejam engravidar.

Apresentação

Comprimido: 400mg
 caixa com 1 comprimido mastigável
 Suspensão:
 4% (40mg/mL)
 frasco de 10mL

Referência

Zentel
 GlaxoSmitKline.



Colchin

colchicina



Registro M.S.

1.2019.0075

Indicações

Artrite gotosa crônica, profilaxia e alívio de ataques agudos.

Contra Indicações

Pacientes com insuficiência renal, hepática ou cardíaca e mulheres grávidas.

Apresentação

Comprimido: 0,5mg
 caixa com 20 comprimidos.

Referência

Colchis
 Apsen.

Fonte: Bula do Produto

Este informativo destina-se exclusivamente aos profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Outubro/2014



TELEVENDAS
 0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistribarma.com.br





Dexagreen

acetato de dexametasona



Registro M.S.

1.2019.0022

Indicações

Antiinflamatório para uso em dermatoses alérgicas, prurido e eczema alimentar.

Contra Indicações

Não usar em pacientes com histórico de hipersensibilidade conhecida a corticóide.

Apresentação

Creme: 0,1 %
bisnaga com 10 g

Referência

Dexason
Teuto.



Estiranox

itraconazol



Registro M.S.

1.2019.0072

Indicações

Antifúngico de micoses de olhos, bocas, unhas, pele, vagina e órgãos internos

Contra Indicações

Pacientes sensíveis a desenvolver qualquer componente da fórmula e mulheres grávidas.

Apresentação

Cápsula: 100mg
caixa com 4 cápsulas

Cápsula: 100mg
caixa com 15 cápsulas

Referência

Sporanox
Janssen-Cilag.

Fonte: Bula do Produto

Este informativo destina-se exclusivamente aos profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Outubro/2014



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistrifarma.com.br



Bulário

Dipirona sódica

Indicação:

Analgésico e antitérmico.

Contra Indicação:

Alergia ou intolerância a dipirona ou algum outro componente da formulação ou outras pirazonas.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

mebendazol

Indicação:

Antihelmíntico polivalente destinado ao tratamento de infestações por: *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermiculares*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Taenia solium* e *Taenia saginata*.

Contra Indicação:

Hipersensibilidade ao mebendazol ou a outro componente de sua formulação.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

nistatina

Indicação:

Antifúngico para o tratamento de candidíase vaginal (monilíase – infecção na mucosa da vagina com lesões esbranquiçadas).

Contra Indicação:

Hipersensibilidade a nistatina ou a outro componente de sua formulação.

Posologia

Geralmente uma aplicação diária (um aplicador cheio) por via intravaginal ou a critério médico.

Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Reação Adversa:

Irritação e sensibilidade, incluindo sensação de queimação e coceira.

Interação Medicamentosa:

A interação com outros medicamentos é desconhecida.

paracetamol

Indicação:

Analgésico e antitérmico.

Contra Indicação:

Hipersensibilidade ao paracetamol ou a outro componente de sua formulação.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

sulfato de gentamicina

Indicação:

Tratamento da asma brônquica, bronquite crônica, enfisema, outras pneumopatias que apresentem broncoespasmo e como miorrelexante uterino no manuseio do trabalho de parto prematuro não complicado.

Contra Indicação:

Hipersensibilidade ao sulfato de terbutalina ou a outro componente de sua formulação.

E em casos de infecção intrauterina, pré-eclâmpsia grave, placenta prévia, hemorragia pré-parto de qualquer etiologia, compressão do cordão umbilical ou qualquer outra condição da mãe ou do feto que contraindique o prolongamento da gravidez.

Posologia:

Via subcutânea

- Adultos: 0,5 mL a 1 mL por via subcutânea, até o máximo de quatro vezes ao dia.

- Crianças: ¼ a ½ da dose do adulto, a critério médico.

A dose de 0,5 mg não deverá ser excedida em um período de 4 horas.

- Trabalho de parto prematuro: as doses devem ser individualizadas, tomando-se em referência a supressão das contrações uterinas, aumento da frequência cardíaca e alterações na pressão sanguínea, que são fatores limitantes do uso de beta-2 estimulantes nesta indicação. Esses parâmetros deverão ser cuidadosamente controlados durante a administração do medicamento.

Via infusão

Diluir 5 mg (10 ampolas) em 1000 mL de soro glicosado 5% (a solução

preparada contém 5 mcg/mL) e administrar endovenosamente a uma velocidade de 20 a 30 gotas/ minuto.

A solução preparada deve ser utilizada dentro de 12 horas.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Bacidermina (sulfato de neomicina + bacitracina zíncica)

Indicação:

Tratamento de infecções de pele e/ou de mucosas e pequenas queimaduras.

Contra Indicação:

Hipersensibilidade ao sulfato de neomicina e bacitracina zíncica ou a outro componente de sua formulação.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Benzol (albendazol)

Indicação:

Usado para o tratamento de infestações causadas por vermes ou parasitas.

Contra Indicação:

Hipersensibilidade ao albendazol, a medicamento similares como mebendazol e tiabendazol ou a outro componente de sua formulação.

Posologia:

Indicações	Idade	Dose
<i>Ascaris lumbricoides</i> <i>Necator americanus</i> <i>Trichuris trichiura</i>	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg ou 10 mL da suspensão a 4% - Dose única
	Crianças de 1 a 2 anos de idade	5 mL da suspensão a 4% - Dose única
<i>Enterobius vermicularis</i> <i>Ancylostoma duodenale</i>	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg ou 10 mL da suspensão a 4% - Dose única
<i>Strongyloides stercoralis</i> <i>Taenia sp.</i> <i>Hymenolepis nana</i>	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg ou 10 mL da suspensão a 4% - 1 dose por dia durante 3 dias
Giardíase (<i>Giardia lamblia</i> , <i>G. Duodenalis</i> , <i>G. intestinalis</i>)	Crianças de 2 a 12 anos de idade	400 mg ou 10 mL da suspensão a 4% - 1 dose por dia durante 5 dias
<i>Larva migrans</i> cutânea	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg ou 10 mL da suspensão a 4% - 1 dose por dia por 1 a 3 dias
Opistorquíase (<i>Opisthorchis viverrini</i>)	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg ou 10 mL da suspensão a 4% - 2 doses por dia durante 3 dias

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Reações Adversas:

Reações incomuns (ocorrem de 0,1% a 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor epigástrica ou abdominal, dor de cabeça, vertigem, enjôo, vômito ou diarreia

Reações raras (ocorrem de 0,01% a 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): alergias e elevações dos níveis de algumas enzimas do fígado.

Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): vermelhidão da pele, uma doença conhecida como síndrome de Stevens-Johnson, caracterizada por vermelhidão intensa, descamação da pele e lesões, com possibilidade de sintomas sistêmicos (que abrangem todo o organismo) graves.

Colchin (colchicina)

Indicação:

Indicado no tratamento das crises agudas de gota e na prevenção das crises agudas nos doentes crônicos (artrite gotosa aguda e crônica), em casos de escleroderma, poliartrite da sarcoidose e psoríase ou febre familiar do Mediterrâneo.

Contra Indicação:

Hipersensibilidade a colchicina ou a outro componente de sua formulação. Nas insuficiências renais, hepáticas ou cardíacas severas e durante a gravidez.



Posologia:

1 comprimido uma ou três vezes ao dia, ou a critério médico.

Informe o seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis.

Este medicamento não deve ser usado durante a gravidez e a lactação.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Não tome remédio sem o conhecimento do seu médico, pode ser perigoso para sua saúde.

Reações Adversas:

Diarréia, náuseas e mais raramente vômitos; raramente podem ocorrer problemas hematológicos; excepcionalmente azoospermia; e outras reações como urticária e erupções cutâneas, debilidade muscular e urina sanguinolenta.

Interação Medicamentosa:

Medicamentos neoplásicos rapidamente citolíticos, bumetamida, diazóxido, diuréticos tiazídicos, furosemida, pirazinamida ou triantereno. Uso com fenilbutazona pode aumentar o risco de leucopenia ou trombocitopenia. A absorção de Vitamina B12 pode ser alterada.

Colipan (butilbrometo de escopolamina)

Indicação:

Tratamento sintomático de cólicas dos tratos gastrintestinal e geniturinário, e discinesias das vias biliares.

Contra Indicação:

Hipersensibilidade ao butilbrometo de escopolamina ou a outro componente de sua formulação. Não deve ser administrado em pacientes com miastenia gravis, megacólon, diarreia aguda, para idosos especialmente sensíveis aos efeitos secundários dos antimuscarínicos, como secura da boca e retenção urinária. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Dexagreen (acetato de dexametasona)

Indicação:

Anti-inflamatório e antipruriginoso tópico utilizado no tratamento dermatoses. Prurido anogenital inespecífico, dermatoses alérgicas como as dermatites de contato, dermatite atópica (eczema alérgico), neurodermatites, pruridos com liquenificações, dermatite eczematoide, eczema alimentar, eczema infantil e dermatite actínica, tratamento sintomático da dermatite seborreica, miliária, impetigo, queimadura devido aos raios solares, picadas de insetos e otite externa (não havendo perfuração da membrana do tímpano).

Contra Indicação:

Hipersensibilidade ao acetato de dexametasona ou a hipersensibilidade conhecida a corticóides ou a outro componente de sua formulação. Este medicamento não deve ser aplicado em presença de tuberculose da pele, varicelas, infecção por fungo ou herpes simples.

Posologia:

Aplique uma pequena quantidade do creme no local afetado, 2 ou 3 vezes por dia.

Reações Adversas:

A administração de corticoides se fará estritamente sob orientação médica. no caso de se desenvolverem infecções durante o uso, a aplicação deve ser interrompida até que o estado infeccioso seja controlado por medidas adequadas. Devido ao uso de corticosteroides tópicos podem ocorrer: sensação de ardor, coceira, irritações, securas, foliculite, hipertricose, erupções acneiformes, hipopigmentação, dermatite alérgica de contato, maceração da pele, estrias e miliária.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

Dorgex (salicilato de metila + associações)

Indicação:

Reumatismo, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares.

Contra Indicações:

Hipersensibilidade ao salicilato de metila ou a outro componente de sua formulação.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

Estiranox (itraconazol)

Indicação:

Tratamento de infecções fúngicas (micoses) dos olhos, boca, unhas, pele, vagina e órgãos internos.

Contra Indicação:

Hipersensibilidade ao itraconazol ou a outro componente de sua formulação.

Este medicamento pode agravar as crises de insuficiência cardíaca. Informe seu médico se você estiver usando qualquer outro medicamento, pois o uso em conjunto com alguns medicamentos pode ser prejudicial. **Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

Posologia:

INDICAÇÃO	DOSE DIÁRIA	DURAÇÃO
Micose vaginal	200 mg (2 cápsulas) pela manhã e à noite	1 dia
Micose de pele	200 mg (2 cápsulas) uma vez ao dia	7 dias
	ou 100 mg (1 cápsula) uma vez ao dia	2 semanas *
* Se a micose ocorrer na palma das mãos ou na planta dos pés, a dose será de 2 cápsulas, duas vezes ao dia por 7 dias		
Micose oral	100 mg (1 cápsula) uma vez ao dia	2 semanas
Infecção ocular	200 mg (2 cápsulas) uma vez ao dia	2 semanas
Infecção sistêmica	100 - 400 mg (1 - 4 cápsulas) diariamente	Períodos prolongados
Micose nas unhas: dependendo da sua necessidade, seu médico escolherá entre um tratamento contínuo ou por ciclos (Pulsoterapia).		
Tratamento contínuo para micoses nas unhas dos pés	200 mg (2 cápsulas) uma vez ao dia	3 meses
Pulsoterapia	200 mg (2 cápsulas) duas vezes ao dia	1 semana **

** Após isso, interromper o tratamento por 3 semanas. Então, o ciclo é repetido, uma vez para as lesões das unhas das mãos e duas vezes para as lesões das unhas dos pés (com ou sem lesões nas unhas das mãos) (Veja a tabela a seguir).

PULSOTERAPIA

Semanas de tratamento

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
Apenas as unhas das mãos	Tomar 2 cápsulas 2 vezes ao dia	Não tomar			Tomar 2 cápsulas 2 vezes ao dia	Interromper o tratamento			
Unhas dos pés com ou sem envolvimento das unhas das mãos	Tomar 2 cápsulas 2 vezes ao dia	Não tomar		Tomar 2 cápsulas 2 vezes ao dia	Não tomar		Tomar 2 cápsulas 2 vezes ao dia	Interromper o tratamento	

Reações Adversas:

Desconforto estomacal, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, constipação ou excesso de gases no estômago. Falta de ar, tosse, líquido nos pulmões, alteração da voz, inflamação dos seios paranasais (sinusite), inflamação do nariz, infecção do trato respiratório superior, dor de cabeça, alteração da menstruação, disfunção da ereção, tontura, confusão, tremor, sonolência, cansaço, calafrios, fraqueza ou dor muscular, dor nas articulações, dor no peito, inchaço, inchaço generalizado, inflamação do pâncreas, gosto desagradável, febre, transpiração excessiva ou queda de cabelo também podem ocorrer. Além disso, aumento na frequência do coração, aumento da pressão sanguínea, diminuição da pressão sanguínea ou insuficiência do coração. Alterações em exames laboratoriais. Irritação da pele, coceira, urticária, falta de ar ou dificuldade de respirar e/ou rosto inchado. Com pouca frequência podem ocorrer diminuição da sensibilidade nas pernas, sensação de formigamento nos membros ou outros problemas com os nervos nos braços ou pernas. Muito raramente hipersensibilidade à luz solar ou lesão grave de pele (erupção generalizada com descamação da pele e bolhas na boca, olhos e genitais ou erupção com pequenas pústulas ou bolhas) podem ocorrer.

Interação Medicamentosa:

Terfenadina, astemizol, mizolastina; bepridil, felodipino, nisoldipino, lercanidipina, ivabradina, ranolazina, eplerenona; cisaprida; sinvastatina e lovastatina; midazolam (oral) e triazolam; lurasidona, pimozida, sertindol; colchicina; levacetilmetadol e metadona; halofantrina; irinotecano; di-hidroergotamina ou ergotamina; ergometrina ou metilergometrina; disopiramida, dronedarona, quinidina e dofetilida.





Greenpharma Química e Farmacêutica Ltda

Quadra 2A - Módulos 32/35 - DAIA - ANÁPOLIS - GO
CEP 75133-600 - Fone 62 3310-6400 - Fax 62 3310-6401
www.greenpharma.com.br



criação e arte: KLEYMILTON CARVALHO (62) 9231-3399



TELEVENDAS
0800 084 3026

E-COMMERCE
www.grupodistrifarma.com.br

